

مقایسه هزینه - اثربخشی روش دیالیز با پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی

در بیمارستان شهید هاشمی نژاد

دکتر ایرج کریمی^۱ - دکتر علیرضا ظهور^۲ - امیر ویانچی^۳

چکیده

مقدمه: همودیالیز به مدت طولانی و استفاده از پیوند کلیه متداول ترین روش درمانی برای بیماران با نارسایی کلیوی است. با توجه به تقاضای روزافزون بیماران کلیوی برای دریافت خدمات درمانی، دو روش استفاده از پیوند کلیه و همودیالیز به مدت طولانی وجود دارد که مقایسه هزینه - اثربخشی دو روش بر کاستن بار بیماری ها ضروری به نظر رسید.

روش پژوهش: این پژوهش به صورت مقطعی به منظور مقایسه هزینه اثربخشی دو روش درمانی استفاده از همودیالیز به مدت طولانی و پیوند کلیه با استفاده از شاخص دالی به کمک اطلاعات پرونده های بیمارانی که در سال ۱۳۷۸ به بیمارستان هاشمی نژاد برای درمان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت.

یافته ها: در این بررسی میزان هزینه ها به قیمت سال ۱۳۷۸ محاسبه گردید. نتایج نشان داد که در روش پیوند کلیه، هزینه بیماران مرد تنها ۲۲/۶ درصد و بیماران زن ۱۸/۵ درصد هزینه های روش دیالیز مزمن بوده است. اثربخشی پیوند کلیه بیش از ۷ برابر روش همودیالیز مزمن در مقیاس دالی به دست آمد. در مجموع، هزینه - اثربخشی روش پیوند کلیه بیش از ۸ برابر روش درمانی همودیالیز است.

بحث و نتیجه گیری: میانگین هزینه دوره درمان روش دیالیز مزمن بیش از چهار برابر روش پیوند کلیه است. اثربخشی براساس شاخص دالی، در روش پیوند کلیه تا سن ۵۴ سالگی در بیماران موردنظر پژوهش نسبت به روش دیالیز مزمن بیشتر است. در مقایسه هزینه - اثربخشی روش پیوند کلیه در گروههای سنی قابل مقایسه، ۳ تا ۱۴ برابر روش دیالیز مزمن است.

کلید واژه ها: هزینه - اثربخشی، شاخص دالی، دیالیز مزمن، پیوند کلیه

مقدمه

با توجه به تقاضای روزافزون بیماران کلیوی برای دریافت خدمات درمانی، یکی از دو روش همودیالیز به مدت طولانی و پیوند کلیه جهت آنان صورت می گیرد (۱). مقایسه هزینه - اثربخشی دو روش مذکور برای کاهش بار بیماری بسیار ضروری به نظر می رسد.

روش پژوهش

این پژوهش به صورت مقطعی به منظور

مقایسه هزینه - اثربخشی دو روش درمانی، استفاده از "همودیالیز" به مدت طولانی و "پیوند کلیه" با استفاده از شاخص دالی به کمک اطلاعات پرونده های بیمارانی که در سال ۱۳۷۸ به بیمارستان هاشمی نژاد برای درمان مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. در این بررسی هزینه های پرداخت شده برای دیالیز مزمن براساس دفعات انجام دیالیز برای هر بیمار در سال ۱۳۷۸ تعیین گردید و هزینه برای سالهای پیگیری درمان با هزینه تمام شده در سال ۱۳۷۸ برآورد شد. اثربخشی بر حسب

- ۱- استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
- ۲- دانشیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ایتمدیلوژیست (Ph.D)
- ۳- کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

روش پیوند کلیه بیشترین مخارج در سال اول هزینه می شود و هزینه های پیگیری در سالهای بعد کاهش می یابد.

بیماران تحت درمان (با هر دو روش) کاملاً بهبود نیافته و بسته به روش درمان به درجاتی از ناتوانی مبتلا می شوند. هریک از بیماران در هر روش، در فاصله ای از سلامت کامل (عدد صفر) تا ناتوانی کامل و مرگ (عدد یک) قرار می گیرند. در روش دیالیز مزمن، بیماران زن وزن ناتوانی $0/19$ و بیماران مرد وزن ناتوانی $0/22$ داشتند. در روش پیوند کلیه هم، بیماران زن وزن ناتوانی کمتری در مقابل بیماران مرد دارند که به ترتیب وزن ناتوانی $0/16$ و $0/19$ است. می توان گفت زنان مبتلا به بیماری "نارسائی کلیوی در مرحله آخر" تحمل و توانایی بیشتری نسبت به مردان دارا بوده و با مشکلات و مسائل مرتبط با درمان در هر دو روش سازگاری بیشتری دارند. در کل روش پیوند کلیه به دلیل ایجاد ناتوانی کمتر در بیماران از روش دیالیز مزمن ارجحتر است. میانگین اثر بخشی هر دو روش با افزایش سن کاسته می شود و میانگین اثر بخشی در جنس مونث در دو روش درمان بیشتر است.

بحث و نتیجه گیری

در مقایسه هزینه- اثر بخشی براساس شاخص دالی، روش پیوند کلیه به مراتب بهتر از روش دیالیز مزمن است. هزینه- اثر بخشی روش پیوند کلیه با افزایش سن سیر نزولی دارد. تفاوت هزینه- اثر بخشی بین دو روش در بیماران مرد (23 میلیون ریال به ازای یک دالی) از بیماران زن (18 میلیون ریال به ازای

شاخص دالی با توجه به سالهای از دست رفته تطبیقی و همچنین درمان ناتوانی به کمک فرمول ذیل محاسبه گردید(۲).

$$YLDS = D \left[\frac{Kce^{ra}}{(r+\beta)^2} [e^{-(r+\beta)(L+a)} - e^{-(r+\beta)(a)}] + \frac{1-K(1-e^{-rl})}{r} \right]$$

که: پایه لگاریتم طبیعی = e ؛

$0/16243 =$ ثابت تطبیقی (C)؛

$1 =$ (لرزش نسبی سن) K؛

سالهای توان با ناتوانی = YLDS.

میانگین دوره درمان (برحسب = L)؛

سن ابتلا به بیماری در گروه سنی = a؛

$4 =$ (پارامتر بانک جهانی) β؛

$3 = r$ و

وزن ناتوانی = D است.

قابل ذکر آنکه سالهای از دست رفته ناشی از مرگ زودرس، با استفاده از جدول امید به زندگی استاندارد برآورد گردید.

یافته ها

میانگین هزینه دوره درمان روش دیالیز مزمن براساس قیمت های سال ۱۳۷۸ در بیماران زن 162 میلیون ریال و در بیماران مرد 124 میلیون ریال و در روش پیوند کلیه در بیماران زن 30 میلیون ریال و در بیماران مرد 28 میلیون ریال برآورد گردید. در هزینه دوره درمان برای روش دیالیز مزمن $10/535$ میلیون ریال و برای روش پیوند کلیه $2/401$ میلیون ریال تعیین شد. اختلاف بسیار زیاد هزینه های تمام شده دو روش، مربوط به تکرار مخارج روش دیالیز مزمن در تمام سالهایی است که بیمار زنده می ماند. برای

قابل توجهی نسبت به پیوند کلیه دارد که لزوم ادامه درمان با این روش بدون در نظر گرفتن هزینه آن کماکان وجود خواهد داشت.

در مقایسه ناتوانی بیماران مورد مطالعه با بیماران مشابه در کشورهای ژاپن و استرالیا روش پیوند کلیه به ترتیب ۱۵ و ۵۵ درصد بیشتر با ناتوانی همراه بوده، اما روش دیالیز مزمن در بیماران مورد بحث، در مقایسه با کشورهای پیش گفت به ترتیب ۲۴ و ۳۸ درصد کمتر با ناتوانی همراه بوده است. در مقایسه با بیمارستان جونز دانشگاه موناشر استرالیا، پیوند کلیه ۶ درصد ناتوانی بیشتر و روش دیالیز مزمن ۴۹ درصد ناتوانی کمتری در بیماران مورد نظر داشته است. در صورت قضاؤت یکسان بیماران از رفاه و سلامت، می‌توان گفت عملکرد بیمارستان شهید هاشمی نژاد در مورد بیماران دیالیز مزمن رضایت بخش بوده است.

یک دالی) بیشتر است. الگوی برتری هزینه- اثر بخشی روش پیوند کلیه به روش دیالیز مزمن بالحاظ نکردن ارزش نسبی سن تغیر نقصانی کمی می‌کند اما دامنه هزینه- اثر بخشی آن تا ۲۵ درصد کاهش می‌یابد. هزینه- اثر بخشی روش دیالیز مزمن به تغییر مقدار k تقریباً بی تفاوت است (جدول ۳). هزینه تولید یک سال زندگی سالم با روش دیالیز مزمن حدود ۲۳ میلیون ریال و در روش پیوند کلیه تنها با ۳ میلیون ریال ایجاد می‌شود. مقدار تولید سرانه یک فرد سالم به قیمت بازار در سال ۱۳۷۸، ۶۷ میلیون ریال بوده است (۴). روش پیوند کلیه بسیار هزینه- اثر بخش تلقی می‌شود در صورتی که روش دیالیز مزمن با توجه به این که از سه برابر تولید سرانه ناخالص کشور هم بیشتر می‌شود، هزینه اثر بخش تلقی نمی‌شود. البته درمان با روش همودیالیز به دلیل سادگی، خطر کمتر، در دسترس بودن و طول عمر بیشتر، اثر بخشی

جدول ۱: وزن ناتوانی در بیماران دیالیزمزمن و پیوند کلیه بر حسب جنس

در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران - ۱۳۷۸

جنس	روش درمان		وزن ناتوانی	پیوند کلیه
	زن	مرد		
زن			۰/۱۶	۰/۱۹
مرد			۰/۱۹	۰/۲۲
میانگین			۰/۱۷	۰/۲۱

جدول ۲: میانگین اثر بخشی روش دیالیز بر حسب دالی در گروه سنی و جنس بیماران

در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران - ۱۳۷۸

مرد	پیوند کلیه	دیالیز مزمن		روش درمان و جنس		گروه سنی (سال)
		زن	مرد	زن	مرد	
۱۳/۴	۱۵/۳	-	-	-	-	۵-۱۴
۱۶/۵	۱۷/۲	-	-	۲۶/۰	-	۱۵-۲۴
۱۷/۲	۱۶/۱	۲۰/۸	۲۱/۴	-	-	۲۵-۳۴
۱۲/۰	۱۲/۰	۱۴/۸	۱۵/۳	-	-	۳۵-۴۴
۸/۷	۹/۰	۹/۱	۹/۰	-	-	۴۰-۵۴
۵/۷	۵/۸	۴/۹	۵/۲	-	-	۵۵-۶۴
۲/۴	۳/۰	۲/۵	۲/۸	-	-	۶۵-۷۴
-	-	۰/۲	۰/۳	-	-	+۷۵

جدول ۳ : مقایسه هزینه- اثر بخشی ($k=1$) روش دیالیز با پیوند کلیه در گروههای تحت بررسی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران - ۱۳۷۸

پیوند کلیه (میلیون ریال بر دالی)			دیالیز مزمن (میلیون ریال بر دالی)			گروه سنی (سال)		
جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن			
۴/۰	۱/۶	۲/۴	-	-	-	-	۵-۱۴	
۲/۴*	۱/۷	۱/۸	۱۷/۰	-	-	۱۷/۰	۱۵-۲۴	
۴/۲	۲/۲	۲/۰	۶۱/۷	۳۳/۸	۲۷/۹	۲۵-۳۴		
۵/۱	۲/۷	۲/۴	۴۵/۴	۲۵/۱	۲۰/۳	۳۵-۴۴		
۶/۸	۳/۴	۳/۴	۴۰/۸	۲۹/۲	۱۱/۶	۴۵-۵۴		
۹/۵	۴/۹	۴/۶	۳۴/۷*	۱۷/۱	۱۷/۷	۵۵-۶۴		
۱۷/۸*	۸/۴	۸/۳	۵۶/۵	-۲۴/۵	۳۲/۰	۶۵-۷۴		
-	-	-	۳۲۲/۳	۲۹۲/۰	۳۰/۸	+۷۵		
۲/۶	۲/۷	۲/۵	۲۲/۶	۲۶/۵	۲۰/۱	میانگین		

* علت تفاوت مختصر با مقادیر زن و مرد در برخی از سطرهای، مربوط به گردشدن این مقادیر است.

جدول ۴: مقایسه هزینه- اثر بخشی ($k=0$) روش دیالیز با پیوند کلیه در گروههای تحت بررسی در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران - ۱۳۷۸

پیوند کلیه (میلیون ریال بر دالی)			دیالیز مزمن (میلیون ریال بر دالی)			گروه سنی		
جمع	مرد	زن	جمع	مرد	زن			
۵/۵	۲/۲	۳/۳	-	-	-	-	۵-۱۴	
۵/۲	۲/۶	۲/۶	۲۳/۰	-	-	۲۳/۰	۱۵-۲۴	
۵/۹	۳/۰	۲/۸	۷۷/۹	۴۲/۸	۳۵/۲	۲۵-۳۴		
۷/۲	۳/۲	۲/۹	۵۲/۲	۲۸/۸	۲۲/۴	۳۵-۴۴		
۷/۴	۳/۸	۳/۶	۴۱/۶	۲۹/۷	۱۱/۸	۴۵-۵۴		
۸/۳	۴/۳	۴/۰	۳۰/۳	۱۵/۰	۱۵/۳	۵۵-۶۴		
۱۲/۶	۶/۶	۶/۰	۴۱/۷	۱۸/۶	۲۳/۲	۶۵-۷۴		
-	-	-	۲۸۷/۳	۲۶۰/۹	۲۱/۴	+۷۵		
۳/۲	۳/۳	۳/۱	۲۲/۸	۲۰/۳	۲۱/۰	میانگین		

فهرست منابع

- ۱- اصول طب داخلی هاریسون، ترجمه مرتضی دلارخان، چاپ یازدهم، نشر بشری، ۱۳۷۰.
- ۲- World Bank. World Development port. Oxford, Oxford University Press, 1990
- ۳- "بار بیماری با ارزیابی جامع مرگ و ناتوانی ناشی از بیماریها . آسیبها و عوامل ریسک در ۱۹۹۰ و برآورد شده تا ۲۰۲۰". ترجمه پژمان شادپور پژمان، ناشر: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یونیسف، آبان ۱۳۷۷
- ۴- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری، سال ۱۳۸۰، ص ۸۵۸

Abstract

Comparative Study of cost-effectiveness of Dialysis and kidney Transplant Using Delphi index, Shahid Hasheminejad Hospital

I. Karimi (Ph.D)¹, A. Zohoor (Ph.D)², A. Vianchi³

Introduction: long-term hemodialysis and kidney transplantation are the most common treatment for kidney failure. Regarding the increasing demand of these patients to receive therapeutic services, cost-effectiveness of these methods are compared.

Method: This Cross – Sectional research was done to compare cost – effectiveness of long – term hemodialysis and kidney transplantation using Delphi index and patients' medical records. Research population are Kidney patients referring to Shahid Hasherminejad Hospital in 1378.

Finding: In this survey expenses of 1378 were tallied. Findings show that kidney transplantation expenses were 38% and 18.5% of long-term hemodialysis for male and female patients, respectively. In Delphi Scale, effectiveness of kidney hausplautation was 7 times more than long-term hemodialysis. In summation, cost-effectiveness of kidney Hausplantation is 8 times more than hemodialysis.

Conclusion: Long-term dialysis average expenses are four times more than kidney transplantation index of effectiveness in kidney transplantation method was more than long-term dialysis up-to the age 54 in the research population. Cost-effectiveaess of kidney transplantation method in different age groups is 3-14 times more than long-term dialysis.

Keywords: Cost-effectiveness, Delphi, Long-term dialysis, kidney

¹ - Professor Assistant, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences

² - Associate Professor, Ph.D in Epidemiology, School of management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences

³ - M.S. in Health Economic